

Voltaren Balsem Pereda Nyeri dengan Herbal

Komposisi:

- Methyl salicylate 22%
- Minyak Eucalyptus 4.4%
- Minyak Turpentine 4.4%
- Menthol 3.3%
- Minyak Cengkeh 0.11%

Indikasi

Membantu meredakan nyeri otot dan sendi seperti nyeri pada otot punggung dan keseleo.

Dosis dan Aturan Pakai

Hanya untuk penggunaan topical.

Untuk digunakan pada orang dewasa dan anak-anak berusia 12 tahun ke atas.

Oleskan dengan tipis produk pada area kulit yang terasa nyeri 3 sampai 4 kali sehari.

Setelah penggunaan:

- Bersihkan tangan dengan handuk atau tisu atau pengering lalu cuci bersih.
- Tunggu sampai produk mengering sebelum Anda mandi.

Kontraindikasi (Lihat box warning)

Jangan gunakan produk ini jika:

Anda alergi terhadap methyl salicylate, menthol atau bahan lain yang terdapat dalam produk ini.

Peringatan dan Perhatian

Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan produk ini, jika Anda alergi terhadap obat anti-inflamasi non-steroid yang digunakan untuk mengobati rasa sakit, demam atau peradangan, seperti Ibuprofen atau Aspirin atau Anda sedang mengalami mengi atau sesak napas atau polip hidung.

Hentikan perawatan jika muncul ruam kulit setelah penggunaan produk.

Jangan oleskan produk pada luka terbuka atau ruam kulit.

Voltaren Pain-Relief Balm with Herbal

Ingredients:

- Methyl salicylate 22%
- Eucalyptus Oil 4.4%
- Turpentine Oil 4.4%
- Menthol 3.3%
- Clove Oil 0.11%

Indication

Helps to relieve muscle and joint pain, such as backache and sprains.

Dosage and How to Use

For topical use only.

For use in adults and children aged 12 years and above.

Apply a thin layer of product onto the skin area where you have pain 3 to 4 times per day.

After using the product:

- Clean your hands with towel or tissue or dryer then wash them clean.
- Wait until the product dries before showering or bathing.

Contraindication (See the box warning)

Do not use this product if:

You are allergic to methyl salicylate, menthol or any other ingredients of this product.

Warning and Caution

Consult your doctor before using this product, if you are allergic to non-steroidal anti-inflammatory drugs used to treat pain, fever or inflammation, such as Ibuprofen or Aspirin or you are experiencing wheezing or shortness of breath or nasal polyps.

Discontinue the treatment if a skin rash develops after applying the product.

Do not apply to open wounds or damaged skin.

Berhati-hatilah jangan sampai produk ini masuk ke mata, hidung, dan mulut Anda. Jika hal ini terjadi, segera bilas dengan air. Temui dokter Anda jika ketidaknyamanan berlanjut.

Jangan ditelan. Jika tertelan secara tidak sengaja, konsultasikan dengan dokter.

Jangan gunakan bersamaan dengan kassa.

Jangan mengoleskan lebih dari satu lapisan tipis, gunakan pada bagian dimana Anda merasa nyeri.

Jangan gunakan bersamaan dengan bantal pemanas.

Jika rasa sakit tidak membaik dalam 7 (tujuh) hari, atau makin memburuk, hubungi dokter.

Jangan berikan produk ini kepada anak di bawah 12 tahun, kecuali diresepkan oleh dokter.

Kejang dapat terjadi pada anak-anak dengan riwayat kejang.

Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Informasi tentang minyak kayu putih

Pada anak di bawah usia 30 bulan, minyak kayu putih dapat memicu terjadinya kejang pada otot di sekitar pita suara, sehingga anak menjadi tersedak.

Interaksi

Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan produk ini jika:

Anda sedang rutin mengonsumsi obat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah (obat pengencer darah atau antikoagulan) karena dapat meningkatkan risiko pendarahan.

Be careful not to get this product in your eyes, nostrils and mouth. If this happens, rinse well with water. See your doctor if any discomfort persists.

Do not swallow. In case of accidental ingestion, consult a doctor.

Do not use together with gauze.

Do not apply more than a thin layer, using only enough to cover the affected area where you have pain.

Do not use with a heating pad.

If the pain does not improve within 7 (seven) days, or it gets worse, contact a doctor.

Do not give this product to children under 12 years, unless prescribed by a doctor.

Seizures can occur in children with a history of seizures.

Keep out of reach of children.

Information on Eucalyptus oil

In children below 30 months old, Eucalyptus oil may induce spasm of the muscles around the voice box, causing choking.

Interaction

Check with your doctor before use if:

You are taking medicines used to prevent blood-clotting ("blood thinners" or anticoagulants) as it may result in increased risk of bleeding.

Kehamilan dan Laktasi

Periksa dengan dokter Anda sebelum menggunakan produk ini jika:

- Anda hamil
- Anda sedang menyusui

Kejadian tidak diinginkan

Saat menggunakan produk ini, Anda mungkin dapat mengalami: hipersensitivitas pada area pengolesan produk, reaksi kulit; sensasi terbakar pada kulit, ruam, gatal.

Overdosis

Segera konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda menggunakan produk ini lebih dari yang seharusnya atau jika produk ini tertelan.

Kemasan

Jar @ 20 gram No. Reg. QI 194709611

Cara Penyimpanan

Simpan pada suhu kurang dari 30°C.
Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Hanya untuk pemakaian luar

Diproduksi oleh:

SmithKline Beecham (PVT) Ltd.
Moratuwa - Sri Lanka

Diimpor oleh:

PT. Sterling Products Indonesia
Jakarta - Indonesia

Pregnancy and Lactation

Check with your doctor before using this product if:

- You are pregnant
- You are breastfeeding

Adverse event

When using this product, you may experience:

hypersensitivity on the area of product application, skin reactions; burning sensation on the skin, rashes, itching.

Overdose

Consult your doctor immediately if you apply the product more than you should or if you swallow this product.

Packaging

Jar @ 20 gram No. Reg. QI 194709611

Storage Instruction

Store at temperatures less than 30°C.
Keep out of reach of children.

Only for external use

Manufactured by:

SmithKline Beecham (PVT) Ltd.
Moratuwa - Sri Lanka

Imported by:

PT. Sterling Products Indonesia
Jakarta - Indonesia